

**HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSITARIO DE ELCHE  
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA  
Y PATOLOGÍA CÉRVICO-FACIAL**

**Dr. E. Infante Matarredona**

**Dr. V. Alberola Terol, Dr. V. Cantó Soler, Dr. J. Hurtado García, Dr. D. Espuch,  
Dr. F. Menor Ibáñez, Dr. F. Morera Pérez, Dra. A. Muñoz Barranco, Dr. G. Martín  
del Guayo, Dr. F. García**

S. ORL Hospital General Universitario de Elche, c/Huertos y Molinos s/n 03600 ELCHE  
ALICANTE

Tnos: 966679122/ 966679123, Fax: 966679108, e-mail: einfante@alc.es

---

### **AMIGDALITIS**

Su hijo ha sido diagnosticado de AMIGDALITIS CRÓNICA, AMIGDALITIS DE REPETICIÓN O HIPERTROFIA DE AMIGDALAS.

Los 3 cuadros clínicos dan origen a episodios repetidos de amigdalitis, fiebre, adenitis cervical (ganglios), etc.

En el desarrollo del niño se consideran normales, hasta los 7 años, que presenten hasta 4 episodios de amigdalitis para poner en marcha su sistema inmunitario pero si presentan más episodios y no remiten con tratamiento médico, o si la analítica entre los episodios está alterada indicando la permanencia de un foco de infección es aconsejable plantearse la posibilidad de una intervención quirúrgica (AMIGDALECTOMIA).

También es aconsejable realizar la intervención en el caso de una Hipertrófia de Amígdalas que dificulta la respiración y deglución (alimentación) del niño o que origine Apneas del sueño.

Por otra parte es aconsejable no realizar la intervención en niños con problemas alérgicos (puede empeorar el cuadro alérgico), problemas de coagulación o niños con alteraciones del paladar (fisuras, paladar corto, etc.).

Si presenta además una Hipertrófia de Adenoides (Vegetaciones) la intervención se realizaría mediante Amigdalectomía y Adenoidectomía.

La intervención se realiza siempre bajo anestesia general y el niño permanece ingresado hasta 24 horas después de la intervención debido al riesgo de sangrado que presenta en las 24 horas del postoperatorio (no deben tomar Aspirina 10 días antes de la intervención).

También aunque más remoto existe riesgo de sangrado a los 7 días de la intervención al caer la escara de la cicatrización por lo que se revisan en consultas en ese tiempo.