

DOCUMENTO DE INFORMACION PARA INTERVENCION DE TIMPANOTOMIA EXPLORADORA / ESTAPEDECTOMIA / ESTAPEDOTOMIA

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS

Estas intervenciones están destinadas a solucionar la sordera producida por la otosclerosis: una lesión que habitualmente es bilateral y progresiva y que además puede producir ruidos en los oídos (acúfenos) y mareos.

No tiene tratamiento médico eficaz.

Consiste en reemplazar un huesecillo del oído (estribo), que se ha fijado a las estructuras vecinas, por una prótesis. Para acceder al oído afecto, la intervención se realiza habitualmente mediante incisión de la piel por dentro del conducto auditivo externo y en ocasiones del trago.

El objetivo de la intervención es mejorar la audición.

Al ser una patología que afecta habitualmente a ambos oídos se realizara primero la intervención del oído más sordo, pudiendo intervenir en un segundo tiempo el otro oído, siempre que los resultados del primero hayan sido satisfactorios.

EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION

Los vitales son muy raros, aunque como en toda intervención quirúrgica con anestesia general / local pueden producirse.

- Puede ocurrir pérdida de la audición respecto a la previa a la intervención. En un mínimo porcentaje de los casos puede producirse una pérdida total de la audición.
- Si existen previamente ruidos de oídos (acúfenos) o mareos, pueden persistir o incluso aparecer después de la intervención.
- Es muy poco frecuente la pérdida de movilidad del lado de la cara del oído intervenido por afectación del nervio facial (parálisis facial). Cuando se produce suele ser pasajera, aunque también puede ser definitiva.
- Ocasionalmente, se produce en alteraciones del sentido del gusto en el lado de la lengua del oído operado. Este es un inconveniente que puede durar unas pocas semanas o que puede ser permanente.
- En algunas ocasiones puede ser necesaria la reintervención debido a un mal resultado de la prótesis

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

Mejoría de la audición.

ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS

La otosclerosis no tiene tratamiento médico eficaz. La alternativa terapéutica es la prótesis auditiva (audífono)

EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA NO REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La no-realización del tratamiento condicionará la persistencia de la sordera que habitualmente será progresiva, así como la persistencia o aparición de ruidos en los oídos y en ocasiones inestabilidad.

LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA

La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión

El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en cualquier momento

INFORMACIÓN ADICIONAL

.....
.....
.....