

RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES OPERADOS DE MICROCIROUGIA ENDOLARINGEA

Usted ha sido hoy operado/a de una MICROCIROUGIA ENDOLARINGEA esta es una intervención que se realiza a través de la boca, mediante un sofisticado y delicado instrumental para poder obtener una mayor precisión. No tendrá ninguna cicatriz visible.

la molestia que va a tener será dolor de garganta, para evitarlo tomará un comprimido de PARACETAMOL de 650 mg, (Dolo-stop, Gelocatil, Termalgin, Febrectal, Eferalgan, etc) cada 6 horas, durante las primeras 24 horas, que le dará la enfermera responsable de la UNIDAD DE CIRUGIA SIN INGRESO.

RECOMENDACIONES

Durante las próximas 48 horas es conveniente que coma una dieta blanda como flanes, tortillas, fruta, etc.

No tome bebidas alcohólicas y bajo ningún concepto debe fumar.

Es conveniente que hoy esté en casa acostado en la cama o en un sofá.

La recomendación más importante es que no haga esfuerzos al hablar, hable poco y no grite, durante al menos 15 días.

No olvide seguir las instrucciones de la hoja de Alta de la Unidad de Cirugía sin Ingreso que se le adjunta.

Es necesario que avise a su médico en caso de:

Dolor excesivo que no cede con los analgésicos habituales

Sangrado

Fiebre de más de 38° C

Si presenta dificultad para respirar acuda al servicio de urgencias del hospital.

Pregunte las dudas que tenga a la enfermera o al médico que lo ha operado/da.

Le deseamos que tenga una recuperación rápida y satisfactoria,

Ante cualquier duda o complicación llame al hospital y pregunte por el Otorrinolaringólogo responsable de la UCSI o acuda al servicio de urgencias del hospital.