

RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES OPERADOS DE MIRINGOPLASTIA

Usted ha sido hoy operado/a de una MIRINGOPLASTIA esta es una intervención que se realiza a través del conducto auditivo externo o a través de una incisión detrás de la oreja que será prácticamente invisible.

La molestia que va a tener será un moderado dolor, para evitarlo tomará un comprimido de PARACETAMOL de 650 mg, (Dolo-stop, Gelocatil, Termalgin, Febrectal, Eferalgan, etc) cada 6 horas, durante las primeras 24 horas, que le dará la enfermera responsable de la UNIDAD DE CIRUGIA SIN INGRESO.

RECOMENDACIONES

Durante las próximas 48 horas es conveniente que coma una dieta blanda como flanes, tortillas, fruta, etc.

No tome bebidas alcohólicas y bajo ningún concepto debe fumar. Es conveniente que hoy esté en casa acostado en la cama o en un sofá.

No moje el vendaje hasta la revisión por el especialista.

Mantenga el vendaje hasta la revisión por el especialista.

No olvide seguir las instrucciones de la hoja de Alta de la Unidad de Cirugía sin Ingreso que se le adjunta.

Es necesario que avise a su médico en caso de:

Dificultad para cerrar el ojo

Desviación de la boca

Dolor excesivo que no cede con los analgésicos habituales

Sangrado importante por el oído

Fiebre de más de 38°C

Pregunte las dudas que tenga a la enfermera o al médico que lo ha operado/da.

Le deseamos que tenga una recuperación rápida y satisfactoria,

Ante cualquier duda o complicación llame al hospital y pregunte por el Otorrinolaringólogo responsable de la UCSI o acuda al servicio de urgencias del hospital.