

DOCUMENTO DE INFORMACION PARA INTERVENCION DE SUBMAXILECTOMIA

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS

La submaxilectomía consiste en la extirpación de la glándula submaxilar, que se encarga de la producción de saliva y se encuentra en la parte superior del cuello, por debajo de la mandíbula. Habitualmente, este tipo de intervención se practica bajo anestesia general.

Esta indicado realizar una submaxilectomía ante tumores de la glándula,. ante inflamaciones (submaxilitis) crónicas de la misma y cuando se forman cálculos.

Ante un tumor maligno puede ser necesario extirpar, junto con la glándula, estructuras vecinas como piel, músculos, mandíbula, nervios o los ganglios de la zona (vaciamiento ganglionar cervical) y también puede ser necesario añadir algún tratamiento complementario tras la cirugía, como radioterapia o quimioterapia.

EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION

Los riesgos vitales son poco frecuentes, aunque como en todo acto médico y teniendo en cuenta la necesidad de anestesia general en todos los casos, pueden producirse. Estos riesgos vitales, tanto intra como postoperatorios son los propios de cualquier cirugía mayor y están íntimamente relacionados con la edad, el estado general del paciente y la patología asociada que el paciente presente.

Las **complicaciones** de esta cirugía incluyen:

- Complicaciones inherentes al acto anestésico.
- Hemorragia aguda, que puede requerir transfusión.
- Lesión reversible o irreversible, parcial o total del nervio facial en su rama inferior (que en ocasiones está ya afectado por la propia enfermedad), con la consiguiente parálisis del labio inferior del mismo lado.
- Lesión reversible o irreversible del nervio lingual, con la consecuente parálisis de la mitad correspondiente de la lengua.
- Infección de la herida.
- Como consecuencia de alguna de estas complicaciones puede ser necesario someter al paciente a reintervenciones.
- Alguna de estas complicaciones puede ser muy grave e incluso puede comprometer la vida.

Los **Efectos Secundarios** que pueden quedar tras una submaxilectomía son las siguientes:

- Cicatriz y alteración estética con hundimiento de la zona de la cara donde se hallaba la glándula.
- Adormecimiento y dolor de la zona operatoria.
- Parálisis facial y/o lingual, cuando se haya lesionado el nervio.

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

El diagnóstico cierto y el tratamiento del proceso en caso de buenos resultados y no-reproducción del tumor

ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS

Si se trata de infecciones o inflamaciones crónicas la alternativa es el tratamiento médico de los episodios de reagudización. En el caso de algún tipo de tumor, si ya tenemos un diagnóstico cierto, son alternativas, aunque con efectividad variable, la Radioterapia y la Quimioterapia.

EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA NO REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.

En caso de tumores malignos la evolución sin tratamiento es siempre hacia la destrucción local y fallecimiento del paciente en un plazo indeterminado, pudiendo presentar complicaciones durante su evolución que dependerán de la localización tumoral.

Si nos encontramos ante un proceso inflamatorio o infeccioso crónico la evolución suele implicar sucesivos procesos de reagudización, con dolor y complicaciones infecciosas.

Si de lo que se trata es de un tumor benigno, el no tratarlo permite que siga creciendo, dando alteraciones estéticas faciales y funcionales (alteración de la masticación, deglución,...) por compromiso de espacio.

LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA

La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión

El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en cualquier momento

INFORMACIÓN ADICIONAL

.....
.....
.....