

**HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSITARIO DE ELCHE
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
Y PATOLOGÍA CÉRVICO-FACIAL**

Dr. E. Infante Matarredona

**Dr. V. Alberola Terol, Dr. V. Cantó Soler, Dr. J. Hurtado García, Dr. D. Espuch,
Dr. F. Menor Ibáñez, Dr. F. Morera Pérez, Dra. A. Muñoz Barranco, Dr. G. Martín
del Guayo, Dr. F. García**

S. ORL Hospital General Universitario de Elche, c/Huertos y Molinos s/n 03600 ELCHE
ALICANTE

Tnos: 966679122/ 966679123, Fax: 966679108, e-mail: einfante@alc.es

OTITIS MEDIA SECRETORA

Tras las exploraciones realizadas se le ha diagnosticado una Otitis Media Secretora que es la causa de sus problemas de audición debido al mal funcionamiento de su oído medio y que ha dado lugar a que acumule contenido líquido en su interior y por tanto que presente una hipoacusia (sordera).

Habitualmente no presenta ni dolor de oídos ni tampoco supuración, salvo que coincida con una otitis aguda, y si se trata de niños pequeños la hipoacusia hay que sospecharla ya que ellos no son capaces de distinguir si oyen bien o mal debiendo sospechar que existe en niños distraídos, con retrasos del habla, retrasos escolares, etc.

En casos iniciales puede resolverse con tratamiento médico durante un tiempo pero si no se consigue resolver o si recae con frecuencia en el mismo cuadro es conveniente plantearse la indicación quirúrgica para la colocación de DRENAJES TRANSTIMPÁNICOS.

La intervención, habitualmente con anestesia general sobretodo en niños, consiste en realizar una Miringotomía (hacer una pequeña perforación en el tímpano) para colocar el Drenaje que es un pequeño tubo en forma de diábolo que queda fijo en el tímpano para mantener la perforación por donde se vacía el líquido contenido en el oído medio y por donde se airea el oído. Es una intervención breve y sencilla y en el caso de los niños suele realizarse al mismo tiempo que la Adenoidectomía o la Amigdalectomía ya que con frecuencia se asocia a problemas de Adenoides (Vegetaciones).

Los Drenajes permanecen unos meses en el tímpano y en ese tiempo no puede mojarse los oídos por el riesgo de infección. Esto aconseja que se intente no colocar drenajes en los meses próximos al verano si es posible ya que el riesgo de infección por los baños es mayor.

Es por tanto una intervención que está indicada en ésta patología pero que nunca es urgente y no siempre imprescindible ya que existe tratamiento médico que en muchos casos resuelve el problema.